

Kiveskohjun tukkiminen

Olet saanut lähetteen kiveskohjun tukkimiseen eli embolisaatioon. Toimenpiteen kesto on yleensä 1–2 tuntia, lisäksi jälkihoito 2–3 tuntia.

Saapumisohteessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää toimenpiteestä.

Ennen toimenpidettä

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen toimenpidettä.

- Ole syömättä ja juomatta vähintään 2 tuntia ennen toimenpidettä.
- Ota mukaan eväät.
- Käy suihkussa toimenpidepäivän aamuna.
- Älä tule toimenpiteeseen omalla autolla.

Lääkärin määräämät lääkkeet saat ottaa normaalisti.

Jos käytät verenohennuslääkitystä, noudata tauotuksessa hoitavan yksikön antamaa ohjetta.

Toimenpiteen aikana

Toimenpiteen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä.

Sinulle kerrotaan toimenpiteen etenemisestä.

Tutkimus tehdään nivustaipeen laskimon kautta paikallispuudutuksessa.

Laskimoon laitetaan kuvauskatetri, ruiskutetaan varjoainetta ja otetaan röntgenkuvia.

Hoitotoimenpiteessä katetri viedään kiveslaskimoon ja laskimo tukitaan metallilankakierukoilla ja tukkivalla lääkeaineella.

Toimenpiteeseen saattaa liittyä kivuntunnetta, johon saat tarvittaessa kipulääkettä.

Toimenpiteen jälkeen

Kun toimenpide on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä käsin painamalla. Toimenpiteen jälkeen olet vuodelevossa 2–3 tuntia.

Jatkohoidosta saat ohjeet röntgenistä.

Kotiin pääset toimenpidepäivänä.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda normaalisti.

Toimenpiteen tuloksen kuulet sinua hoitavalta urologilta.
Hän käy katsomassa sinua toimenpiteen jälkeen ja määrittää tarvittaessa sairausloman pituuden.

Potilasohje
HUS Kuvantaminen
Radiologia

2 (2)

[tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi)

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.