

Skleroterapi av lymfatisk missbildning

Du har fått en remiss till skleroterapi av missbildning av lymfkärl.

Åtgärden tar i regel 0,5–1 timmar och eftervården ytterligare 0,5–2 timmar.

Före åtgärd

Om du är överkänslig för bedövningsmedel eller jodhaltigt kontrastmedel eller om du är/misstänker att du är gravid, ska du in-formera den remitterande läkaren eller röntgenskötaren om detta före åtgärden.

- Ät, drick och rök inte under minst 2 timmar före åtgärden.
- Ta en dusch på morgonen samma dag som åtgärden ska genomföras.
- Ta de läkemedel som läkare ordinerat som vanligt.
- Var beredd på att du inte får köra bil på 6 timmar efter åtgärden.

Under åtgärd

Före åtgärden byter du till sjukhusets kläder. En venkanyl läggs in i handvenen.

Först undersöks stället som ska behandlas med ultraljud och tas beslut om i vilken ställning behandlingen görs. Du får information om hur åtgärden framskrider.

Åtgärden görs under lokalbedövning. En tunn nål förs in i lymfkärl och från den sprutas kontrastmedel och läkemedel in.

Åtgärden kan vara förenad med smärta, som du får smärtlindring för.

Efter åtgärd

När åtgärden är klar får du vila på röntgenavdelningens övervakning.

Läkaren skriver vid behov ett sjukskrivningsintyg.

Du får noggrannare anvisningar om den fortsatta vården på röntgenavdelningen.

Efter undersökningen får du äta och dricka som normalt om du mår bra.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.