

Valtimoiden varjoainetutkimus polikliinisesti

Olet saanut lähetteen polikliinisesti tehtävään angiografiatutkimukseen.

Angiografialla tarkoitetaan verisuonten kuvaamista varjoaineella.

Tutkimuksesta voidaan käyttää myös nimitystä polikliininen angiografia.

Tutkimuksen kesto on yleensä 1–3 tuntia sekä lisäksi jälkihoito 2–6 tuntia.

Saapumisohteessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai **jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana**, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 4 tuntia ennen tutkimusta.
- Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.

Jos sinulla on verenohennuslääkitys tai insuliinihoitoinen diabetes, hoitava yksikkö antaa sinulle lääkityksestä erillisen ohjeen.

- Ota mukaan eväät.

- Sovi, että saattajasi tulee hakemaan sinut sairaalasta tutkimuksen jälkeen. Sinulla on oltava seuralainen kotona tutkimuksen jälkeiseen aamuun asti.
- Ota huomioon, ettet voi ajaa autoa tutkimuksen jälkeen samana päivänä.
- Joskus hoito vaatii sairaalaan jäämistä, varaudu siihen.

Tutkimuksen aikana

Ennen tutkimusta vaihdat sairaalan vaatteet ja tarvittaessa saat esilääkkeen. Käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Tutkimuksen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä. Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.

Tutkimus tehdään yleensä nivustaipeen valtimon kautta paikallisuudutuksessa. Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri, ruiskutetaan varjoainetta ja otetaan röntgenkuvia. Varjoaine saattaa aiheuttaa lämmöntunnetta.

Tutkimukseen liittyy usein hoitotoimenpide esim. pallolaajennushoito tai verkkoputken asennus.

Tutkimuksen jälkeen

Kun tutkimus on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä. Tarvittaessa pistokohtaa tuetaan painopussilla.

Tutkimuksen jälkeen on oltava 2–6 tuntia vuoteessa.

Vuodelevon jälkeen on hyvä lepäillä seuraavaan aamuun, wc:ssä voi käydä.

Ponnistelua on syytä välttää neljän päivän ajan.

Saunomista ja kylpemistä tulee välttää viikon ajan, suihkussa voi käydä tutkimuksen jälkeisenä päivänä.

Jälkihoidosta saat tarkemmat ohjeet röntgenosastolta.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda vointisi mukaan normaalisti.

Jos hoitosi vaatii sairaalaan jäämistä, sinulle järjestetään jatkohoitopaikka sairaalan vuodeosastolle tutkimuspäivän iltaan tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa.

Saat tutkimuksen vastaukset ja jatkohoidon lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.