

## Eritetahradesinfektio

Eritteet kuten veri, virtsa, maha-suolikanava-, haava- ja trakeeeritteet sisältävät usein paljon mikrobeja. Lattia-, kaluste- ja kosketuspintoilla eritetahrat toimivat mikrobien kasvualustana ja aiheuttavat sairaalassa infektioriskin. Henkilökunnan tulee poistaa eritetahra ja desinfioida kontaminoitunut alue heti sen havaittuaan. Eritetahrojen poistoon tarvittavat välineet sijoitetaan osastolla yhteisesti sovittuun paikkaan.

Eritetahradesinfektioaineet:

Oxivir Plus Spray (vetyperoksidi) 3,5 % valmis käyttöliuos, tehoaa norovirukseen, tbc

Oxivir Plus (vetyperoksidi) 3,5 % tehoaa norovirukseen, tbc (15% käyttöliuos tehoaa *Cl.difficile* itiöihin)

Virkon (peroksygeeni) 1 % käyttöliuos (ei tehoa *Cl.difficile* itiöihin). Vaikutusaika 10 min.

Klorilli (klooriyhdiste, kloramin-T) 1 000 ppm käyttöliuos (tehoaa *Cl.difficile* itiöihin), tbc

Tevan Panox 200 (vetyperoksidi), 2% valmis käyttöliuos, tehoaa noro- ja adenovirukseen

Käyttöliuos valmistetaan osastolla tarkoitusta varten nimikoituun annostelupulloon. Laimennos tehdään pakkauksen ohjeen mukaisesti. Liuoksen viimeinen käyttöpäivä merkitään annostelupulloon. Jos käytetään valmiita käyttöliuoksia, pulloon merkitään käyttöönottopäivä sekä voimassaoloaika avaamisen jälkeen. Noudata lisäksi valmistajan puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Tutustu myös Pintadesinfektioaineet ohjeeseen.

Välineet

- kertakäyttöisiä suojakäsineitä
- käsidesinfektioaine
- imeviä kertakäyttöpyyhkeitä
- eritetahradesinfektioaine
- roskapussi

#### Toteutus – Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio

- Desinfioi kädet.
- Pue kertakäyttöiset suojakäsineet.
- Imeytä erite ensin kertakäyttöpyyhkeeseen ja laita likainen pyyhe roskeen.
- Lisää eritealueen päälle puhtaalla käsinekadella desinfektioainetta.
- Pyyhi pinta puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä ja laita pyyhe roskeen.
- Riisu suojakäsineet roskapussiin.
- Pese ja desinfioi kädet.
- Vaikutusaika on pinnan pyyhintään ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita.
- Huolehdi, että erite ja poistamisessa käytettävät välineet eivät levitä mikrobeja edelleen.

Laajalla alueella olevien veri- ja eritetahrojen poistossa voidaan käyttää lattiakuivainta ja kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä. Eritteet poistetaan ensin lattiakuivaimella ja pinta pyyhitään desinfektioaineeseen kostutetuilla siivouspyyhkeillä.