

Kontrastundersökning av stomagång

Vid undersökningen klarläggs hur gången som mynnar ut i huden, dvs. fisteln, förlöper och dess omfattning.

Undersökningen kallas också fistulografi.

Reservera cirka 1–2 timmar för besöket.

Undersökningen tar cirka 30 minuter.

En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före undersökningen

- Före undersökningen kan du äta och dricka normalt.
- **Om du är överkänslig för jodhaltigt kontrastmedel**, berätta det möjligast snabbt för läkaren som skickade dig till undersökningen.
- **Om du är gravid eller misstänker att du är det**, kontakta den poliklinik eller avdelning som skickade dig till undersökningen.

Under undersökningen

Då undersökningen pågår ligger du på röntgenbordet.

Röntgenläkaren sätter in en tunn nål eller slang, dvs. kateter, i hålrummet eller hålgången.

Genom nålen eller katetern injicerar röntgenläkaren kontrastmedel och tar samtidigt röntgenbilder.

Efter undersökningen

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Ta med dig tidigare röntgenbilder (CD-skiva) från området som ska undersökas om du har fått dem.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

