

Eturauhasen magneettitutkimus

Tutkimuksella halutaan tutkia eturauhasen mahdollisia muutoksia.

Magneettitutkimuksella saadaan tarkkoja kuvia ilman säteilyä.

Kuvaus tehdään laitteella, joka on kuin molemmista päistä auki oleva tunneli.

Tutustu esitietolomakkeeseen etukäteen. Ota täytetty esitietolomake mukaasi.

Tule kuvauspaikkaan 30 minuuttia ennen sinulle ilmoitettua tutkimusaikaa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 3 tuntia.

Tutkimus kestää yleensä 30–60 minuuttia. Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Jos sinulla on ahtaanpaikankammo eli klaustrofobia, kerro siitä sinut tutkimukseen pyytävälle röntgenhoitajalle.

Jos tiedät tarvitsevasi rauhoittavaa lääkettä, tule paikalle 30 minuuttia ennen sinulle annettua tutkimusaikaa.

Kerro ilmoittautuessasi, että sinulla on ahtaanpaikankammo ja tarvitset rauhoittavan lääkkeen.

Voit ottaa mukaan tukihenkilön.

Hän voi olla kuvauksen aikana kuvaushuoneessa, jos hänellä ei ole siihen esteitä. Katso esitietolomake.

Jos sinulla on lonkassa keinonivel eli lonkkaproteesi, soita siihen yksikköön, johon sinulle on varattu kuvausaika. Lonkan keinonivel voi vaikuttaa siihen, millä laitteella sinut kuvataan. Yhteystiedot ovat saapumisohjeessa.

Ennen tutkimusta

Suoliston tyhjentämistä varten osta apteekista Toilax- yhdistelmäpakkaus, jossa on 4 tablettia ja peräruiske. Saat ne ilman reseptiä.

On tärkeää, että tyhjennät peräsuolen ohjeen mukaan.

Päivä ennen tutkimusta:

- Syö ja juo normaalisti.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.
- Ota aamulla 2 Toilax-tablettia. Katso ohje pakkauksesta.
- Ota illalla 2 Toilax-tablettia.

Tutkimuspäivänä:

- Ota korut pois ja jätä ne kotiin.
- Laita kotona peräruiske 3–4 tuntia ennen tutkimusta.
Katso ohje pakkauksesta.
Peräruiske tyhjentää peräsuolen.
- Älä syö mitään 4 tuntiin ennen tutkimusta.
- Voit juoda vettä
- Ota lääkkeet, joita käytät säännöllisesti.
- **Jos sinulla on lääkelaastari**, ajoita sen vaihto tutkimuspäivään.
Ota vanha laastari pois tutkimuksen ajaksi.
Laita uusi lääkelaastari tutkimuksen jälkeen.
- **Jos sinulla on kudosten sokeria mittaava sensori**, se on otettava pois ennen kuvausta.
Ota uusi sensori mukaan.

Tutkimuksen aikana

Ennen tutkimuksen aloittamista sinun on käytävä wc:ssä.

Ennen kuvausta vaihdat sairaalan vaatteet.

Röntgenhoitaja auttaa sinut mukavaan makuuasentoon kuvauslaitteen pöydälle.
Et saa liikkua, jotta kuvaus onnistuu.

Saat korville korvatulpat ja kuulosuojaimet, koska kuvauslaite pitää kovaa ääntä.
Voit kuunnella radiota, jos haluat.

Röntgenhoitaja on tutkimuksen ajan viereisessä huoneessa.
Hän näkee ja kuulee sinut tutkimuksen aikana.

Sinulle laitetaan kanyyli verisuoneen.
Saat sen kautta lääkettä, joka rentouttaa suolistoa.
Näin saadaan paremmat kuvat.

Röntgenlääkäri päättää, tarvitseeko sinulle antaa magneettitehosteainetta verisuoneen.
Tehosteaine auttaa kudosten erottumista kuvissa.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lisätietoa

Lue lisää internetistä tutkimukseen.fi >> Eri tutkimuksia >> [Magneetti](#).

Katso video [youtube.com](https://www.youtube.com) >> Tutkimukset minuutissa: [Magneettikuvaus](#).
Tekstitys: suomi, ruotsi, englanti.