

## Aakkosellinen luettelo mikrobeista ja infektiosairauksista

Jos infektiota/ sairautta ei ole luettelossa, potilaan hoidossa käytetään pääsääntöisesti tavanomaisia varotoimia.

Infektio/ sairaus	Suositus (tavanomaisten varotoimien lisäksi)
<b>A</b>	
Absessi	Jos eritteet tahraavat ympäristöä, Kosketusvarotoimet. Muuten Tavanomaiset varotoimet.
Acinetobacter baumannii, Acin MDR	Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin Acin MDR-ohje.
<b>Adenovirusinfektio</b>	Ks. ohje respiratorista virusinfektiota sairastavan potilaan varotoimet
<b>Apinarokko</b>	<b>Kts. M-rokko (ent. apinarokko)</b>
A-streptokokki	Kts. Streptokokki, ryhmä A (Str. pyogenes)
<b>C</b>	
Candida auris	Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin C. auris-ohje. Konsultoi infektio lääkäriä.
Clostridioides difficile (ent. clostridium difficile)	Kosketusvarotoimet oireiden ajan ja 2 vrk oireiden loputtua, ks. tarkemmin Norovirus-Clostridioides difficile -ohje <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
Covid-19	Koronavirusinfektio todettu tai epäily, ks. Covid-19-ohjeet.
Coxsackievirusinfektio	Ks. enterovirusinfektio.
CPE (karbapenemaasia tuottava enterobakteeri)	Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin CPE-ohje.
Creutzfeld-Jakobin tauti	Erityistoimet instrumenttien osalta, muuten Tavanomaiset varotoimet, Konsultoi infektio lääkäriä. Ks. tarkemmin CJD-ohje
Cytomegalovirusinfektio	Tavanomaiset varotoimet.
Cryptosporidium	Tavanomaiset varotoimet.

**D**

Difteria Ks. kurkkumätä.

**E**

Echovirusinfektio Ks. enterovirusinfektio.

**EHEC**

Lastenosastoilla ja inkontinenteilla: kosketusvarotoimet  
Muilla: Tavanomaiset varotoimet, mielellään 1hh ja oma WC. Konsultoi infektiolääkärää. Ks. tarkemmin THL:n EHEC-ohje.

[Henkilöstö](#): Ks. henkilöstön infektio-ohje

**Enterovirusinfektio**

Lastenosastoilla: kosketusvarotoimet.  
Muilla: Tavanomaiset varotoimet.

[Henkilöstö](#): Ks. henkilöstön infektio-ohje

**ESBL E.coli**

Jos inkontinentti, sekava, alle 7-vuotias tai kyseessä riskiosasto: Kosketusvarotoimet

Muilla: Tavanomaiset varotoimet.

Ks. tarkemmin ESBL-E.coli -ohje.

**ESBL Klebsiella pneumoniae**

Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin ESBL-Klebsiella\_ohje.

**Epiglottiitti**

Pisaravarotoimet, ks. Haemophilus influenzae B.

**G**

Gastroenteriitti Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin Norovirus-Clostridioides difficile-ohje

**Giardiaasi**

Jos eritteet tahraavat ympäristöä: Kosketusvarotoimet

Muutoin: Tavanomaiset varotoimet.

**H**

Haavainfektio Jos eritteet tahraavat ympäristöä: Kosketusvarotoimet  
Muutoin: Tavanomaiset varotoimet.

**Haemophilus influenzae B**

Pisaravarotoimet 24 h tehoavan mikrobilääkehoidon aloituksesta (meningiitti, pneumonia, epiglottiitti).

**Hepatiitti A**

Lastenosastoilla ja inkontinenteilla: Kosketusvarotoimet  
Muilla: Tavanomaiset varotoimet, lisäksi 1hh ja oma WC. Konsultoi infektiolääkärää. Ks. tarkemmin THL:n hepatiitti A- ohje.

[Henkilöstö](#): Ks. henkilöstön infektio-ohje

Hepatiitti B ja C	Tavanomaiset varotoimet.
Hepatiitti E	Tavanomaiset varotoimet. <b>Henkilöstö:</b> Ks. henkilöstön infektio-ohje
Herpes simplex	Yleistynyt infektio oireiden ajan: Kosketusvarotoimet, Muutoin: Tavanomaiset varotoimet.
Herpes zoster	Ks. vyöruusu.
Hinkuyskä, pertussis	Pisaravarotoimet 5 vrk tehoavan mikrobilääkehoidon aloituksesta, ks. tarkemmin THL:n hinkuyskäohje. <b>Henkilöstö:</b> Ks. henkilöstön infektio-ohje
HIV	Tavanomaiset varotoimet.
<b>I</b>	
Ihoinfektio	Jos eritteet tahraavat ympäristöä: Kosketusvarotoimet Muuten: Tavanomaiset varotoimet.
<b>Influenssa</b>	Ks. ohje respiratorista virusinfektiota sairastavan potilaan varotoimet
Isorokko (variola)	Ilma- ja kosketusvarotoimet, Ks. HUS tartuntatautien isorokko-ohje
<b>K</b>	
Kampylobakteeri (Campylobacter)	Lastenosastoilla ja inkontinenteilla: Kosketusvarotoimet Muilla: Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC.
Keuhkokuume (pneumonia)	Tavanomaiset varotoimet.
Kihomadot	Tavanomaiset varotoimet.
Klamydiakeuhkokuume (Chlamydia pneumoniae)	Tavanomaiset varotoimet.
Kolera	Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC.
Koronavirus	Ks. Covid-19 ohjeet.
Kuppa (syfilis, lues)	Tavanomaiset varotoimet.
Kurkkumätä (difteria)	Nielumuoto: Pisaravarotoimet, kunnes vähintään 24 h kuluttua mikrobilääkehoidon loppumisesta 24 h välein otetut

2 viljelyä ovat negatiiviset, ks. HUS Tartuntatautien kurkkumätäohje .

Ihomuoto: Kosketusvarotoimet, kunnes vähintään 24 h kuluttua mikrobilääkehoidon loppumisesta 24 h välein otetut näytteet ovat negatiiviset. Ks. tarkemmin HUS Tartuntatautien kurkkumätäohje

## L

Lapsihalvaus (poliomyeliitti)

Pisaravarotoimet, ks. tarkemmin HUS tartuntatautien polio-ohjeet

Lavantauti

Ks. Salmonella typhi

Legionella pneumophila

Tavanomaiset varotoimet, konsultoi legionellatapauksista infektio lääkäriä

Lude

Tavanomaiset varotoimet, ks. tarkemmin ludeohje.

Listeria (*Listeria monocytogenes*)

Tavanomaiset varotoimet. Konsultoi infektio lääkäriä. Tarkemmin ks. THL:n listeriaohje

## M

**M-rokko (ent. apinarokko)**

Kosketus-, pisara- ja ilmavarotoimet. Ks. tarkemmin M-rokon (ent. apinarokko) erikoissairaanhoidon ohje. Konsultoi apinarokkoepäilyssä infektio lääkäriä.

Malaria

Tavanomaiset varotoimet.

MDRs (moniresistentti gram-negatiivinen sauvabakteeri)

Kosketusvarotoimet

Meningiitti

Hoidetaan aluksi pisaravarotoimien mukaan. Kun taudinaiheuttaja on selvillä, potilas, jolla on meningokokin tai *Haemophilus influenzae b:n* (Hib) aiheuttama meningiitti, hoidetaan Pisaravarotoimet\_24 h tehoavan mikrobilääkehoidon aloituksesta. Konsultoi infektio lääkäriä.  
Muut aiheuttajat: Tavanomaiset varotoimet.

Meningokokki

Pisaravarotoimet\_24 h tehoavan mikrobilääkehoidon aloituksesta, kun meningokokki on eristetty normaalista steriilistä paikasta (esim. likvor ja veri). Konsultoi infektio lääkäriä. Ks. tarkemmin HUS tartuntatautien meningokokki-ohjeet

MRSA	Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin MRSA-ohje.
Mykoplasma pneumoniae	Tavanomaiset varotoimet.
Märkärupi (Impetigo)	Lastenosastoilla: Kosketusvarotoimet Muuten: Tavanomaiset varotoimet.
<b>N</b>	
Neutropenia	Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC.
Norovirus	Kosketusvarotoimet oireiden ajan ja 2 vrk oireiden loputtua, ks. tarkemmin Norovirus-Clostridioides difficile -ohje
<b>P</b>	
Painehaava	Jos runsaasti erittävä haava: Kosketusvarotoimet Muuten: Tavanomaiset varotoimet.
Palovammat	Jos runsaasti erittävä: Kosketusvarotoimet Muuten: Tavanomaiset varotoimet.
Parvorokko (parvovirus B 19)	Immuunipuutteisilla koko hoitajakson ajan: Pisaravarotoimet Muuten: Tavanomaiset varotoimet. <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
Pemfigus neonatorum	Kosketusvarotoimet.
Pernarutto (Bacillus anthracis)	Ks. HUS tartuntatautien pernarutto-ohjeet.
Pikkulavantauti	Ks. Salmonella paratyphi
Pneumocystis jirovecii	Tavanomaiset varotoimet.
Pseudomonas aeruginosa	Jos hälytysjärjestelmätieto ”PseudMDR” tai erittävä haava: Kosketusvarotoimet. Muuten: Tavanomaiset varotoimet.
<b>R</b>	
Rabies	Ks. Vesikauhu
Respiratorinen virusinfektio	Ks. ohje respiratorista virusinfektiota sairastavan potilaan varotoimet

<b>Respiratory syncytial virus (RSV)</b>	Ks. ohje respiratorista virusinfektiota sairastavan potilaan varotoimet
Ripuli, akuutti, infektiöosi	Ks. tarkemmin Norovirus-Clostridioides difficile-ohje
Rutto (Yersinia pestis)	Ks. HUS tartuntatautien Rutto-ohje
<b>S</b>	
Salmonellainfektiot	Lastenosastoilla ja inkontinenteilla: Kosketusvarotoimet Muilla: Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC. ks. Tarkemmin ks. THL:n salmonellaohje. Salmonella typhi ks. kohta Salmonella typhi (lavantauti), Salmonella paratyphi ks. kohta Salmonella paratyphi (pikkulavantauti) <b>Henkilöstö:</b> Ks. henkilöstön infektio-ohje
Salmonella paratyphi (pikkulavantauti)	Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC. Tarkemmin ks. THL:n lavantauti- ja pikkulavantautiohje
Salmonella typhi (lavantauti)	Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC. Tarkemmin ks. THL:n lavantauti- ja pikkulavantautiohje
Shigella	Lastenosastoilla ja inkontinenteilla: Kosketusvarotoimet Muilla: Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC <b>Henkilöstö:</b> Ks. henkilöstön infektio-ohje
Silmän sidekalvon tulehdus (Konjunktiviitti)	Tavanomaiset varotoimet
Sikotauti (parotiitti)	Pisaravarotoimet 9vrk sylkirauhasturvotuksen alusta. Tarkemmin ks. HUS tartuntatautien sikotautiohjeet <b>Henkilöstö:</b> Ks. henkilöstön infektio-ohje
Staphylococcus aureus -märkärupi	Tavanomaiset varotoimet. Kosketusvarotoimet lastenosastoilla.
Streptokokki, ryhmä A (Str. pyogenes)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teho-osastolla hoidettava palovamma tai iho-infektio</li> </ul>	Kosketus- ja pisaravarotoimet 24h ajan tehoavan hoidon alusta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muu runsaasti erittävä iho- tai pehmytkudosinfektio</li> </ul>	Kosketus- ja pisaravarotoimet 24h ajan tehoavan hoidon alusta:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tonsilliitti tai tulirokko lapsella</li> <li>• Muut A-streptokokki-infektiot</li> </ul>	<p>Pisaravarotoimet 24h ajan tehoavan hoidon alusta</p> <p>Tavanomaiset varotoimet</p> <p>Ks. myös HUS tartuntatautien A-streptokokkiohjeet  <a href="#">Henkilöstö</a>: Ks. henkilöstön infektio-ohje</p>
Strongyloides	Kosketusvarotoimet, konsultoi infektiolääkärää.
Syyhy (scabies)	Kosketusvarotoimet 24 h ensimmäisen hoitokerran päättymisestä, ks. tarkemmin Syyhy-ohje. <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
<b>T</b>	
Tuberkuloosi	<a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
-tartuntavaarallinen hengitysteiden tuberkuloosi	Ilmavarotoimet, ks. tarkemmin Tuberkuloosi-ohje; konsultoi keuhko- tai infektiolääkärää
-muu kuin hengitysteiden tuberkuloosi	Ilma- ja kosketusvarotoimet <a href="#">aerosolia</a> tuottavien hoitojen yhteydessä, muuten yleensä Tavanomaiset varotoimet. Ks. tarkemmin Tuberkuloosi-ohje,; konsultoi keuhko- tai infektiolääkärää
Tuhkarokko (morbilli)	Ilma- ja kosketusvarotoimet, kunnes kulunut 4 vrk ihottuman puhkeamisesta. Konsultoi infektiolääkärää. Ks. tarkemmin HUS tartuntatautien tuhkarokko-ohjeet <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
Tulirokko (scarlatina)	Ks. Streptokokki, ryhmä A
Täit (pedikuloosi)	Tavanomaiset varotoimet, ks. tarkemmin Täit. <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
<b>V</b>	
Verenvuotokuumeet	Ks. HUS tartuntatautien Ebola, verenvuotokuumeet -ohjeet
Vesikauhu (rabies)	Ks. HUS tartuntatautien rabies-ohjeet
Vesirokko (varicella)	Ilma- ja kosketusvarotoimet kunnes rakkulat ovat kuivuneet. <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
Vesirokkopneumoniitti	Ilma- ja kosketusvarotoimet koko hoitajakson ajan.

Vihurirokko (rubella)	Pisaravarotoimet 7 vrk ihottuman alusta. <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
VRE	Kosketusvarotoimet, ks. tarkemmin VRE
Vyöruusu (Herpes zoster)	Paikallinen immuunipuutteisilla: Ilma- ja kosketusvarotoimet kunnes rakkulat kuivuneet. Paikallinen muilla potilailla: tavanomaiset varotoimet, jos vyöruusualue peitettyä. Jos ei voida peittää (esim. kasvoissa), kosketusvarotoimet. Yleistynyt: Ilma- ja kosketusvarotoimet kunnes rakkulat kuivuneet. <a href="#">Henkilöstö</a> : Ks. henkilöstön infektio-ohje
<b>Y</b> Yersinia	Lastenosastoilla ja inkontinenteilla: Kosketusvarotoimet Muilla: Tavanomaiset varotoimet, mieluiten 1hh ja oma WC.