

Respiratorista virusinfektiota sairastavan potilaan varotoimet vuodeosastoilla. Ppkl:t/tehot/valvonnat soveltavat mahdollisuuksien mukaan.

	Aikuispotilaat (ei syvästi immuunipuutteiset)	Lapsipotilaat (ei syvästi immuunipuutteiset)	Syvästi immuunipuutteiset potilaat (=esim. kantolu- ja elinsiirtopotilaat sekä hematologisten osastojen potilaat)
Korona	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh/kohortti • FFP2 tai kirurginen suu-nenäsuojain • Aerosolia tuottavassa tmp FFP2 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh/kohortti • FFP2 tai kirurginen suu-nenäsuojain • Aerosolia tuottavassa tmp FFP2 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh • FFP2 tai kirurginen suu-nenäsuojain • Aerosolia tuottavassa tmp FFP2
Influenssa	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh/kohortti jos mahdollista, muuten tilavarotoimet (ei samaan huoneeseen immuunipuutteisen kanssa) • Aerosolia tuottavassa tmp FFP2 • Kesto: 3 vrk lääkehoidon tai 5 vrk oireiden alusta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh/kohortti • Aerosolia tuottavassa tmp FFP2 • Kesto: 3 vrk lääkehoidon tai 5 vrk oireiden alusta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh • Aerosolia tuottavassa tmp FFP2 • Kesto vähintään 10vrk, konsultoi infektio lääkäriä
RSV	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh/kohortti jos mahdollista, muuten tilavarotoimet (ei samaan huoneeseen immuunipuutteisen kanssa) • Kesto 5 vrk oireiden alusta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisara- ja kosketusvarotoimet • 1hh/kohortti • Kesto 10 vrk oireiden alusta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh • Kesto 10 vrk oireiden alusta
Muut respiratoriset virukset tai aiheuttaja ei tiedossa tai testitulokset kesken	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet, voidaan toteuttaa tilavarotoimin. Ei samaan huoneeseen immuunipuutteisen kanssa • Kesto 5 vrk oireiden alusta • Adenoviruspneumonia tai muu vaikeaoireinen adenovirusinfektio: konsultoi infektio lääkäriä varotoimien kestosta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet • 1hh/kohortti • Kesto 5 vrk oireiden alusta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisaravarotoimet 5 vrk, jonka jälkeen infektio lääkäriin konsultaatio • Adenoviruspneumonia tai muu vaikeaoireinen adenovirusinfektio: konsultoi infektio lääkäriä varotoimien kestosta

Epidemiatilanteet ohjeistetaan erikseen