

## Ohutsuolen magneettitutkimus

Magneettitutkimuksella saadaan tarkkoja kuvia ilman säteilyä. Kuvaus tehdään laitteella, joka on kuin molemmista päistä auki oleva tunneli.

Tutustu magneettitutkimuksen esitietolomakkeeseen etukäteen.

**Ota täytetty esitietolomake mukaasi.**

**Tule esivalmistelujen vuoksi 1 tunti ennen ilmoitettua tutkimusaikaa.**

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3 tuntia. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia. Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Jos sinulla on ahtaanpaikankammo kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Sinulla on mahdollisuus saada rauhoittavaa lääkettä ennen tutkimusta. Jos otat rauhoittavan lääkkeen, et voi ajaa autolla.

Voit ottaa mukaan tukihenkilön. Hän voi olla kuvauksen aikana kuvaushuoneessa, jos hänellä ei ole siihen esteitä.

Katso magneettitutkimuksen esitietolomake.

### Ennen tutkimusta

Rautatablettilääkitys on lopetettava vähintään 5 päivää ennen tutkimusta.

### Tutkimuspäivänä

- Älä syö äläkä juo 4 tuntiin ennen varattua aikaa.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet pienen vesimäärän kanssa (ei rautatabletteja). Ei hiilihapotettua vettä/vissyvettä.
- Ota korut pois ja jätä ne kotiin.
- **Jos sinulla on lääkelaastari**, ajoita sen vaihto tutkimuspäivään. Ota vanha laastari pois tutkimuksen ajaksi. Laita uusi lääkelaastari tutkimuksen jälkeen.
- **Jos sinulla on kudostenesteen sokeria mittava sensori**, se on otettava pois ennen kuvausta. Ota uusi sensori mukaan.

45 minuuttia ennen kuvausta saat juotavaksi 1,5 litraa liuosta, joka sisältää sorbitolia. Juomisen aikana kannattaa liikkua jonkin verran, jotta liuos etenisi paremmin suolistossa.

## Tutkimuksen aikana

Röntgenhoitaja auttaa sinut mukavaan asentoon.

Et saa liikkua, jotta kuvaus onnistuu.

Saat korville korvatulpat ja kuulosuojaimet, koska kuvauslaite pitää kovaa ääntä.

Kuulosuojainten kautta saatetaan antaa tutkimuksen aikana hengitysohjeita.

Hengityspidätykset kestävät n. 10–20 sekuntia kerrallaan.

Röntgenhoitaja on tutkimuksen ajan viereisessä huoneessa. Hän näkee ja kuulee sinut tutkimuksen aikana.

Käsivarren laskimoon laitetaan kanyyli. Saat sen kautta lääkettä, joka rentouttaa suolistoa. Näin saadaan paremmat kuvat.

Röntgenlääkäri päättää, tarvitseeko sinulle antaa magneettitehosteainetta verisuoneen. Tehosteaine auttaa siinä, että kudokset erottuvat kuvissa.

## Tutkimuksen jälkeen

Sorbitoli saattaa aiheuttaa ilmavaivoja, vatsan löysyyttä ja ripulia.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

## Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.  
Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

## Lisätietoa

Lue lisää internetistä [www.tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi)  
>> Eri tutkimuksia >> Magneettitutkimus.

Katso video [www.youtube.com](https://www.youtube.com) >>  
Tutkimukset minuutissa: Magneettitutkimus.