

## Potilaan kuljettaminen sairaalassa

Potilaskuljettaja noudattaa aina tavanomaisia varotoimia eli desinfioi kädet ennen ja jälkeen potilaskuljetuksen. **Potilaskuljettaja ei käytä suojakäsineitä kuljetuksen aikana.** Muiden suojaimien käytöstä kuljetuksen aikana ohjataan tässä ohjeessa pisara- ja ilmavarotoimien kohdalla.

Ennen kuljetusta **hoitaja** huolehtii, että potilassängyn päädyt tai pyörätuolin kahvat ovat puhtaat ja sängyn päätyyn lisätään käsihuhde telineessä, jos se puuttuu. **Tarvittaessa sängyn päädyt tai pyörätuolin kahvat pyyhitään tähän soveltuvalla pintadesinfektioliinalla.** Katso - Pintadesinfektioaineet. **Hoitaja huolehtii, että kuljetettavan potilaan potilasvaatteet ja mahdolliset vuodevaatteet ovat puhtaat ja tarvittaessa vaihtaa ne. Tämän lisäksi hoitaja huolehtii, että haavat ja ihorikkoumat on peitetty ja haavasidokset ovat puhtaat.** Myös **potilas** desinfioi kädet ennen kuljetusta, tarvittaessa hoitaja avustaa potilasta käsien desinfektiossa.

### Kosketusvarotoimet

- Toimitaan kuten tavanomaisissa varotoimissa.
- Potilas siirretään suoraan tutkimukseen tai toimenpiteeseen ja takaisin lähtöosastolle

### Pisaravarotoimet

- Toimitaan kuten tavanomaisissa varotoimissa, lisäksi kuljettaja käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta.
- Kuljetuksen aikana potilaalle asetetaan kirurginen suu-nenäsuojain, mikäli potilas pystyy sitä käyttämään.
- Jos potilas ei pysty käyttämään kirurgista suu-nenäsuojainta, hoitaja ohjaa hänelle oikean yskimistekniikan ja antaa nenäliinoja ja roskapussin mukaan kuljetuksen ajaksi.
- Potilas siirretään suoraan tutkimukseen tai toimenpiteeseen ja takaisin lähtöosastolle.

### Ilmavarotoimet

- Toimitaan kuten tavanomaisissa varotoimissa, lisäksi kuljettaja käyttää FFP3-luokan hengityksensuojainta. Jos se ei istu kasvoille tiiviisti, voidaan käyttää erimallista FFP2-luokan venttiilitöntä hengityksensuojainta.
- Kuljetuksen aikana potilas käyttää FFP2-luokan venttiilitöntä hengityksensuojainta (mikäli potilas ei pysty FFP-hengityksensuojainta käyttämään, annetaan hänelle kirurginen suu-nenäsuojain)
- Potilas siirretään suoraan tutkimukseen tai toimenpiteeseen ja takaisin lähtöosastolle.