

## Ulkomailta tulevan potilaan moniresistenttien mikro- bien riskinarvio, varotoimet ja näytteet

<b>Määri- telmä</b>	<b>Vuoden sisällä sairaala- hoito ulkomailla (24 h si- sällä ks. viereinen sarake)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>24h-kestoinen sairaala- hoito</li> <li>Toimenpide: leikkaus, pienkirurginen toimenpide, dialyysi, haavanhoito (ei koske verinäytteenottoa tai kanyylinlaittoa)</li> </ul>	<b>Suora sairaalasiirto tai 24 h sisällä sairaalahoito ul- komailla</b>	<b>Asuu vastaanottokeskuk- sessa tai Vuoden sisällä</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suomeen tulleet turvapai- kanhakija, paperiton ja pa- kolainen</li> <li>ulkomaisessa lastenkodissa asunut</li> </ul>
<b>Varotoi- met</b>	<p>Kosketusvarotoimet kunnes <b>kaikki</b> seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja <b>hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1-hengen huone.</b> Jos 1hh ei ole käytettävissä, voidaan väliaikaisesti hoitaa tilavarotoimin ohjepankki ja siirretään 1hh heti kuin mahdollista.</li> </ul> <p>Tilavarotoimet ohjepankki eivät sovellu, jos potilas on sekava tai eritteet kontaminoivat ympäristöä, esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus.</p>	<p>Kosketusvarotoimet, kunnes <b>kaikki</b> seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja <b>hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1-hengen huone</b></li> </ul>	<p>Kosketusvarotoimet kunnes <b>kaikki</b> seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja <b>hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1-hengen huone.</b> Jos 1hh ei ole käytettävissä, voidaan väliaikaisesti hoitaa tilavarotoimin ohjepankki ja siirretään 1hh heti kuin mahdollista.</li> </ul> <p>Tilavarotoimet ohjepankki eivät sovellu, jos potilas on sekava tai eritteet kontaminoivat ympäristöä, esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus.</p> <p><b>Raskaana oleva turvapai- kanhakija:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jos ensimmäiset seulonta- näytteet negatiiviset, hoito tavanomaisin varotoimin</li> <li>Seulomaton: Kosketusvaro- toimet</li> </ul>
<b>Näytteen- otto</b>	<p><b>MRSA-näytteet yhden ker- ran, MDRs-näytteet kah- tena eri päivänä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen)</li> </ul>	<p><b>MRSA-näytteet yhden ker- ran, muut näytteet kah- tena eri päivänä</b></p>	<p><b>MRSA-näytteet yhden ker- ran, raskaana olevat kts alla</b></p> <p><b>Lisäksi lapsilta MDRs-näyt- teet kahtena eri päivänä</b></p>

			<b>Raskaana oleva turvapaikanhakija:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seulontanäytteet noin kuukautta ennen laskettua aikaa</li> <li>2. seulontanäytteet synnyttämään tullessa. Jos 1. seulonnassa on saatu positiivinen vastaus, ei uusia näytteitä tarvita.</li> </ol>
<b>Näytteenottokohdat</b>	<p><b>MRSA (MRSAVi 4358)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenä, nielu, <b>perineum</b></li> <li>• Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa</li> <li>• Katetrivirtsä, jos katetri on ollut yli viikon</li> <li>• Trakea, jos keinoilmatie</li> </ul> <p><b>MDRs (MDRsVi 6730)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektum</li> <li>• Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiot</li> <li>• Katetrivirtsä, jos katetri ollut &gt; 7 vrk</li> <li>• Trakea, jos keinoilmatie</li> </ul>	<p><b>MRSA (MRSAVi 4358)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenä, nielu, <b>perineum</b></li> <li>• Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa</li> <li>• Katetrivirtsä, jos katetri on ollut yli viikon</li> <li>• Trakea, jos keinoilmatie</li> </ul> <p>Lisäksi sydänleikkaukseen tulleilta lapsilta MRSA-pcr (MRSANhO 4981)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenä, nielu, perineum</li> <li>• Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa</li> </ul> <p><b>MDRs (MDRsVi 6730)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektum</li> <li>• Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiot</li> <li>• Katetrivirtsä, jos katetri ollut &gt; 7 vrk</li> <li>• Trakea, jos keinoilmatie</li> </ul> <p><b>VRE (VREVi 1788)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektum</li> </ul> <p><b>Candida auris (CaauVi 6633)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kainalot (yhdellä tikulla näyte kummastakin kainalosta)</li> <li>• Nivuset (yhdellä tikulla kummastakin nivusesta)</li> <li>• Nielunäyte; jos keinoilmatie, nielun sijasta näyte trakealimasta</li> <li>• Rektum</li> <li>• Haavat (näyte erittävimmästä haavasta),</li> <li>• Katetrivirtsä, jos virtsakatetri ollut &gt;7vrk</li> </ul>	<p><b>MRSA (MRSAVi 4358)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenä, nielu, <b>perineum</b></li> <li>• Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa</li> <li>• Katetrivirtsä, jos katetri on ollut yli viikon</li> <li>• Trakea, jos keinoilmatie</li> </ul> <p>Lisäksi <b>lapsilta MDRs x2 (MDRsVi 6730)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektum</li> <li>• Kahtena eri päivänä</li> <li>• Poliklinikapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen)</li> </ul>