

VRE (Vankomysiinille resistentti enterokokki)

	VRE-kantaja	VRE-altistunut	Muu riski VRE-kantajuu- delle
Määritelmä	- Hälytysjärjestelmässä on tieto VRE-kantajuudesta - Kliinisestä näytteestä löytyy VRE	- Hälytysjärjestelmässä on tieto VRE-altistuksesta - Epidemiaepäilyissä / epide- miatilanteessa näytteenotto ja kosketusvarotoimet oh- jeistetaan erikseen	Sairaalahoito tai toimen- pide ulkomailla 12 kk sisällä ks. erillinen ohje: Moni- resistenttien mikrobien ris- kinarvio, varotoimet ja näytteet potilaan tullessa ulkomailta - Lähetteessä tieto VRE-ris- kistä ks. alla
Varotoimet Potilaan si- joittelu	Kosketusvarotoimet 1-hengen huone - jos 1 hh ei käytettävissä niin yhteys hygieniahoitajaan Tilavarotoimet eivät sovellu Ajantavarausplk tavanomai- set varotoimet	Tavanomaiset varotoimet	Kosketusvarotoimet kunnes kantajuus on poissuljettu seu- lontanäytteillä 1-hengen huone - Jos 1 hh ei käytettävissä niin yhteys hygieniahoitajaan Tilavarotoimet - Ei sovellu, jos eritteet kon- taminovat ympäristöä esim. erittävät haavat tai ulosteinkontinenessi
VRE- näyt- teet (VREVi 1788)	Yhdet seulontanäytteet jos edellisistä positiivista seu- lontanäytteestä on yli vuosi	- Seulontanäytteet 2 eri päi- vänä (esim. peräkkäisenä) - Potilaalle kerrotaan, että ky- seessä on rutiininomainen bakteerikantajuuden pois- sulkeminen, koska hän on mahdollisesti ollut samassa tilassa VRE-potilaan kanssa. Ks potilasohje alempana. - Poliklinikkapotilaasta voi- daan ottaa kahdet seulonta- näytteet samalla käynnillä	- Seulontanäytteet 2 eri päi- vänä (esim. peräkkäisenä) - Potilaalle kerrotaan, että kyseessä on rutiininomai- nen bakteerikantajuuden poissulkeminen, koska hän on mahdollisesti ollut teke- misissä VRE-potilaan kanssa. Ks. potilasohje alempana. - Poliklinikkapotilaasta voi- daan ottaa kahdet seulonta- näytteet samalla käynnillä
Näytteenot- tokohdat	- Rektum - Erittävät haavat - Trakea, jos keinoilmatie - Katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon	Rektum	Rektum
Hälytystie- don purku	Jos näytteet negatiiviset, yh- teys hygieniahoitajaan, joka arvioi, voiko kantajuuden purkaa.	Jos näytteet negatiiviset, yh- teys hygieniahoitajaan, joka voi purkaa altistumisen eril- lisen ohjeen mukaan.	Jos näytteet negatiiviset, yh- teys hygieniahoitajaan.

	- Purkamiseen tarvitaan useita eri aikaan otettuja näytteitä ja mikrobilääkehoito voi vaikuttaa arvioon. - Mikrobilääkehoito voi vaikuttaa arvioon. - Mikrobilääkehoito voi vaikuttaa hygieniahoitajan arvioon.
Siivous	Katso erilliset ohjeet Potilashuoneen siivous ja pyykin käsittely

VRE – lisätietoa

Potilasohjeet	VRE-kantaja: Kysymyksiä ja vastauksia VRE:stä VRE-altistunut: Tietoa altistumisesta VRE-bakteerille
Mikä on VRE ?	VRE = vankomysiinille resistentti enterokokki. Tavallisesti VRE löytyy ulosteesta, mutta usein myös potilaan käsistä ja iholta. VRE leviää tavallisimmin kosketustartuntana henkilökunnan käsien välityksellä potilaasta toiseen. VRE säilyy tarttumiskykyisenä pitkään hoituhuoneen kosketuspinnilla, jos sitä joutuu niihin esimerkiksi eritteiden tai käsien välityksellä. Oireettoman kolonisaation lisäksi VRE voi aiheuttaa infektioita, joista tyypillisimpiä ovat virtsatieinfektiot, leikkausalueen infektiot ja bakteremiat.
Kuka on <u>VRE-kantaja</u>? Kenen tehtävä on kertoa asiasta potilaalle?	Kantajaksi sanotaan henkilöä, jolla on joskus todettu VRE-infektio tai oireeton löydös. Kun näytteestä löytyy VRE, hoitavan lääkärin tehtävä on kertoa asiasta potilaalle. Yllä potilasohje, joka voidaan antaa/lähetetään potilaalle.
Kuka on <u>VRE-altistunut</u>?	Hygieniahoitaja määrittelee henkilön VRE-altistuneeksi, jos häntä on hoidettu samassa potilashuoneessa tai epidemia-aikaan samalla osastolla aiemmin tunnistamattoman VRE-kantajan kanssa. Altistuneella voi olla VRE, ja se tulee sulkea pois VRE-seulontanäyttein.