

Varotoimet ja MRSA-näytteet pistoshuumeiden käyttäjien kohdalla

HUSin alueen suonensisäisiä huumeita käyttävillä on kohonnut MRSA-kantajuuden riski.

- Päivystykseen hakeutuvilta suonensisäisiä huumeita käyttäviltä otetaan infektiopesäkkeiden bakteeriviljelyiden ja mahdollisten veriviljelyiden lisäksi **MRSA-seulontanäytteet (tutkimustilaus 4358)** alla luetelluista kohdista **yhden kerran**.
 - nenä ja nielu sekä **perineum**
 - mahdolliset ihorikot ja haavat
 - katetrivirtsat, jos katetri ollut yli viikon
 - muiden katetrien ja drenien tyvet
- Potilaan hoidossa noudatetaan kosketusvarotoimia, kunnes seulontanäytteet on vastattu negatiivisiksi ja **hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet. Mikrobilääkitys voi vaikuttaa arvioon.**
-
- Jos potilas jää sairaalahoitoon, hänet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan yhden hengen huoneeseen. Jos tällaista ei ole saatavilla, potilasta hoidetaan tilavarotoimien mukaisesti.
- Jos suonensisäisiä huumeita käyttävällä epäillään vaikeaa yleisinfektiota, konsultoidaan infektiolääkärinä mahdollisen MRSA:han kohdistuvan hoidon aloittamisesta.
- Potilasohje: Hygieniaohe pistoshuumeiden käyttäjille MRSA-infektioiden ehkäisemiseksi