

DT-styrda injektioner av läkemedel

Åtgärden kallas också injektion/bedövning av SI- eller facettled eller DT-styrd nervrotsblockad.

Vid datortomografi (DT) tas tvärsnittsbilder med hjälp av röntgenstrålar.

Reservera cirka 1 timme för besöket.

Åtgärden tar cirka 30 minuter.

En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Att köra bil är förbjudet i 24 timmar efter åtgärden.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före åtgärd

- Du får äta och dricka normalt.
- Ta läkarordinerade mediciner enligt anvisningarna.
- Ta smärtstillande läkemedel om det är smärtsamt för dig att ligga stilla.

Under åtgärd

Under åtgärden ska du ligga på mage på undersökningsbordet.

Man försöker finna en så bekväm ställning som möjligt för dig, eftersom man inte får röra på sig under åtgärden.

Injektionsstället rengörs och röntgenläkaren för in bedövningsnålen i objektet under styrning av datortomografin.

När röntgenläkaren försäkrat sig om nålens position sprutar han eller hon in bedövningsmedlet eller kortisonet.

Man följer med hur du mår under hela åtgärden.

Efter åtgärd

Någon egentlig eftervård behövs inte.

På röntgenavdelningen eller vårdavdelningen följer man upp hur du mår under 1/2–1 timme.

Noggrannare anvisningar ges av radiologen och behandlade läkaren.

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

För mera information

Läs mer på internet: www.terveyskyla.fi/sv/undersokningshuset >> Om diagnostiska undersökningar >> [Datortomografi](#)