

Elinsiirtotoimisto puh. 0400 459 060 (24h/vrk)

fax. 020 601 4977

Soitettu / otettu yhteys klo _____

elinsiirtotoimisto@hus.fi

Nimi: _____ Ikä: _____ Paino: _____ kg Pituus: _____ cm

Diagnoosi: _____ Veriryhmä otettu: ☐**Sairaskertomusmerkinnät**

- Neurologiset testit ☐
- Hengitystesti ☐
- Tarv. aivojen TT-angiografia tai DSA ☐
- AIVOKUOLEMA: klo _____ ☐
- Omais keskustelu ☐
- Vainajan kanta elin- ja kudoluovutukseen: kyllä/ei ☐
- Keneltä tieto: _____ ☐
- Dg G93.90 ☐

Hoitovälineet ja muut

- Intubaatio ☐
- Arterianeula ☐
- CVK ☐
- Perifeerinen kanyyli x 2 ☐
- NML ☐
- Virtsakatetri ☐
- Lämpöanturi ☐
- Lämpöpeitto/avaruuslakana ☐
- Silmien kostutus ja peittäminen (NaCl-taitoksilla, vaihto 2 h välein) ☐
- Nimirannekkeet (molempiin ranteisiin) ☐
- + tunnistuskortti varpaaseen ☐
- 2 pussia punasoluja irrotusleikkaukseen ☐
- Ihon tarkastaminen ☐

Näytteet

- Luovutussairaala ☐
- Veripalvelu ☐
- Covid-19 ☐
- aB-Het-Ion (4h välein) ☐

Tutkimukset

- Thorax (viim. 12 h) klo _____ ☐
- EKG ☐
- Vartalon TT ☐

Keuhkoluovuttajat

- ≤ 75 v., ikä+askivuodet < 100 ☐
- Happeutumistesti ☐
- Bronkoskopia ☐

Sydänluovuttajat

- ≤ 60 v. ei sydänsairauksia ☐
- Sydämen UÄ ☐
- Koronaangiografia ☐

Aivokuoleman jälkeen

- Meronem 1g i.v. (x3/vrk) ☐
- Solu-Medrol 1g i.v. (x1/vrk) ☐
- Simvastatiini 80 mg NML (x1/vrk) ☐

Hoidon tavoitteet

- EKG Ei rytmihäiriöitä
Pulssi 60–120/min
- MAP 60–80 mmHg
- RRsyst < 160 mmHg
→ tarvittaessa nesteytys
Balansoitu elektrolyyttiliuos
NaCl 0,45 %
Albumiini 4 % - 5 %

Verenkierron tukilääkkeet

- välttää turhia vasoaktiiveja
- Vasopressiini 0,5–1 ky bolus ja
0,6–2,4 ky/t infuusio
- Noradrenaliini 0,05–0,2 µg/kg/min
- Dopamiini 4–10 µg/kg/min
- Dobutamiini 4–10 µg/kg/min

CVP 6–10 mmHg

Hb > 90 g/l

Ventilaatitavoitteet

- PaO₂ 10–13 kPa
- PaCO₂ 4,5–5,5 kPa
- SpO₂ > 95 %
- Kertaheng. tilavuus (6–)8 ml/kg
- PEEP 8–10 cmH₂O
- Ppeak < 35 cmH₂O
- Pplateau < 25 cmH₂O
- Keuhkojen rekrytaatio tarvittaessa

Lämpö 35–37 °C

Normoglykemia 6–10 mmol/l

Diureesi (0,5–2,5 ml/kg/t)

- Minirin (0,2–0,8 µg)
- Huomioi nestemenetykset ja elektrolyyttitasapaino

Tromboosiprofylaksia**Aspiraation esto**

- Pääty kohoasentoon 30°
- Cuffin paine 25 H₂Ocm
- NML auki pussiin

Irrotusleikkaus

Siirtoaika ja sali: _____

Mukaan: Verituotteet sairaalan käytännön mukaan ☐

Elinirrotuspöytäkirja ☐

Ruumiinavaus: kyllä / ei lääketieteellinen ☐ / oikeuslääketieteellinen ☐

Ilmoitus poliisille: kyllä / ei

Omaisten ohjaus: _____

Vainajan tavarat ja arvoesineet: _____

Vainajan kuljetus ja näyttö: _____