

TAKROLIMUUSILLA (Prograf® tai Adport®) HOIDETTAVAN MUNUAISSIIRTOPOTILAAN LÄÄKITYS

Ennen leikkausta:

Anestesia­lääkärin määräämät esilääkkeet sekä

- **Takrolimuusi:** (Prograf® tai Adport®) 0.08mg/kg per os
- **Mykofenolaaatti (CellCept®)** 500mg per os
- **Somac®** 40mg per os

Leikkaussalissa:

Anestesiainduktiossa

- **Kefuroksiimi** 1,5 g iv

Harkituissa erityisindikaatioissa induktiohoito (esim. korkeasti immunisoituneet potilaat - **varmista aina kirurgilta!!**)

- **Simulect®** 20 mg iv tai
- **Grafalon®** 8 mg/kg iv (4-6h infuusio)

Ennen munuaisen verenkierron kytkemistä (kun munuainen pöydälle)

- **Mannitol** 15% 200 ml
- **Solu-Medrol** 250 mg iv

Heräämössä/osastolla

6 tuntia verenkierron kytk. jälkeen
12 tuntia leikkauksen alkamisesta

- Solu-Medrol** 40 mg iv
- Kefuroksiimi** 750 mg iv

MEDROL	<u>Postop vrk</u>	<u>annos</u>
	1	125 mg iv
	1-14	16 mg po
	15-28	12 mg po

PROGRAF 1. Postop vrk 0.04mg/kg x 2 (Huom! annos pitoisuuden mukaan)

<u>Postop vrk</u>	<u>B-Tacro µg/l</u>
1-90	7-10 µg/l

CELLCEPT 1. postop vrk lähtien 500mg x 2

Verinäytteet 1. POP aamuna KIDLAAJA + B-TacroMS