

Munuaissiirtopotilaan immunosuppressiivinen lääkitys 15.10.2024 lähtien

- **Takrolimuusi+Mykofenolaatti+ Metyyliprednisoloni**
 - PRA <20%
 - (tx kirurgin harkinnan mukaan voidaan käyttää myös siklosporiinia takrolimuusin tilalla)
- **Takrolimuusi+Mykofenolaatti+ Metyyliprednisoloni+ Basiliksimabi**
 - HLA-mm 3/1 tai huonompi
 - immunisoituneet (toistuvasti PRA > 20%, mutta DSA-arvio negatiivinen tai matala positiivinen kumulatiivinen mfi <3000)
 - STAMP ja LAMP osumalla tulleet potilaat
 - uusintasiirtoon tulevat
 - DCDD-siirteen vastaanottajat
- **Takrolimuusi+Mykofenolaatti+ Metyyliprednisoloni+ Grafalon 20 mg/ml**
 - ristikoe negatiivinen, mutta DSA-arviossa kohtalainen tai korkea DSA ja siirtoon halutaan edetä
 - **Grafalon** induktiossa 8mg/kg ja 3 seuraavana vrk 3mg/kg (4h infuusio) + Valcyte munuaisfunktion mukaan 3 kk ajaksi, jos D+/R- 6 kk

HUOM! ohje on suuntaa antava, päivystävä elinsiirtokirurgi päättää potilaan immunosuppressiivisen lääkityksen ottaen huomioon potilaan mahdolliset erityispiirteet.

Marko Lempinen oyl

Ilkka Helanterä oyl

Tehty 20.3.2015 ML/IH

Tarkistettu 29.10.2024