

Katetrin laitto munuaiseen

Sinulla on todettu tukos tai ahtauma virtsateissä, minkä vuoksi virtsa ei kulje munaisesta virtsarakkoon. Tukoksen hoitamiseksi sinulle laitetaan ohut muoviletku eli katetri ihon läpi munuaisaltaaseen. Sen jälkeen virtsa valuu letkua pitkin virtsapussiin.

Munuaisaltaat sijaitsevat munuaisissa vartalon selkäpuolella.

Toimenpiteessä käytetään apuna röntgenlaitetta ja ultraäänilaitetta.

Toimenpiteestä voidaan käyttää myös nimityksiä nefrostomia tai pyelostomia.

Toimenpidettä varten sinut on kutsuttu osastolle, josta sinut viedään röntgeniin toimenpiteeseen. Toimenpiteen jälkeen palaat samalle osastolle.

Katetrin laittaminen kestää yleensä 1–2 tuntia.

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää toimenpiteestä.

Ennen toimenpidettä

- Käy laboratoriotutkimuksissa saamasi ohjeen mukaisesti. Ohjeen on antanut sinua hoitava poliklinikka tai osasto.
- **Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana**, ota mahdollisimman pian yhteyttä siihen poliklinikkaan tai osastoon, josta sinut lähetettiin toimenpiteeseen.
- **Jos olet yliherkkä** puuduttelelle tai jodivarjoaineelle, ota yhteyttä siihen poliklinikkaan tai osastoon, josta sinut lähetettiin toimenpiteeseen.
- Älä syö tai juo aamulla ennen toimenpidettä. Ole vähintään 4 tuntia ilman ruokaa ja juomaa.

Pue sairaalaan tullessasi väljät vaatteet. Kun lähdet kotiin, virtsapussi kiinnitetään reiteen.

Varaudu siihen, että niin kauan kuin sinulle laitettu katetri on paikallaan:

- Et saa käydä uimassa tai saunassa. Suihkussa saat käydä.
- Vältä kovaa fyysisistä rasitusta ja sellaista liikuntaa, jossa vartalo kiertyy kovasti. Et voi esimerkiksi pelata tennistä. Voit kuitenkin esimerkiksi ajaa polkupyörällä.

Lääkkeet

Sinua hoitava lääkäri antaa sinulle erilliset ohjeet etukäteen, jos

- käytät veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä tai
- sinulla on insuliinilla hoidettava diabetes.

Jos et ole saanut ohjeita, ota yhteyttä siihen poliklinikkaan tai vuodeosastoon, josta sinut lähetettiin toimenpiteeseen.

- Jos sinulla on diabetes, jota hoidetaan tableteilla, ota diabeteslääkkeet vasta toimenpiteen jälkeen, koska et saa syödä ennen toimenpidettä.
- Ota muut lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti pienen vesimäärän kanssa.

Toimenpiteen aikana

Ennen toimenpidettä saat antibioottia osastolla tai toimenpiteen yhteydessä.

Sinulle laitetaan kanyyli verisuoneen. Sitä kautta saat tarvittaessa kipulääkettä tai muuta lääkettä.

Toimenpiteen aikana makaat tutkimuspöydällä yleensä vatsallaan.

Ensin lääkäri puuduttaa ihon alaselän alueelta. Jos katetri laitetaan siirtomunuaiseen, puudutetaan alavatsan alue. Sen jälkeen lääkäri pistää neulan munuaiseen ja laittaa katetrin munuaisaltaaseen.

Katetri tulee ihosta ulos selän keskiosasta, tai siirtomunuaisesta alavatsalta. Hoitaja kiinnittää katetrin iholle ja yhdistää sen virtsapussiin.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen sinut viedään takaisin osastolle. Siellä sinua tarkkaillaan 2–6 tuntia.

Sinua hoitava, toimenpiteeseen lähettänyt lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan sinun on käytettävä katetria. Se aika, jonka katetri on paikallaan, on jokaisella erilainen.

Katetri on vaihdettava vähintään 3 kuukauden välein. Sinut toimenpiteeseen lähettänyt poliklinikka tai vuodeosasto huolehtii ajan varaamisesta.

Varo kotona, ettei katetri tai virtsapussin letku tartu kiinni mihinkään ja lähde sen vuoksi pois paikaltaan.

Jos sinulle tulee kysyttävä katetrista, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, joka lähetti sinut toimenpiteeseen.

Ota huomioon

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

