

Selkäydinkanavan varjoainetutkimus

Tutkimuksesta käytetään myös nimitystä TT-myelografia.

Sinulle on varattu aika tietokonetomografiatutkimukseen (TT).

Kyseessä on kuvantamistutkimus, jossa käytetään varjoainetta ja tietokonetomografiaa selkäytimen kanavan ongelmien etsimiseksi.

Tietokonetomografiassa otetaan röntgensäteiden avulla poikkileikkauskuvia.

Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta ja -ajasta.

Tutkimusta varten sinut kutsutaan vuodeosastolle joko tutkimusta edeltävänä päivänä tai tutkimuspäivän aamuna.

Varaudu olemaan osastolla tarkkailtavana seuraavaan päivään.

Tutkimus on kaksivaiheinen ja kestää 2–4 tuntia.

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Varaudu siihen, että **et voi ajaa autoa** 24 tuntiin tutkimuksen jälkeen.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta

- Älä syö mitään 4 tuntiin ennen tutkimusta.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeen mukaan.
- Osastolla saat tarvittavat radiologin määräämät esilääkkeet.
- **Jos sinulla on verenohennuslääkitys**, ilmoita siitä sinua hoitavalle lääkärille jo tutkimusaikaa varattaessa, koska kyseessä oleva lääkitys täytyy keskeyttää 2 päivää ennen tutkimusta.
- **Jos olet yliherkkä jodipitoiselle varjoaineelle**, kerro siitä mahdollisimman pian lääkärille, joka lähetti sinut tutkimukseen.
- **Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana**, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- **Älä aja autoa** 24 tuntiin tutkimuksen jälkeen.

Tutkimuksen aikana

Tutkimus aloitetaan ruiskuttamalla varjoainetta selkäydinkanavaan röntgentutkimushuoneessa.

Sen jälkeen tehdään selkärangan TT-kuvaus.

Kaularangan TT-kuvaus tehdään noin 15 min kuluttua.

Lannerangan tutkimus tehdään noin 2–4 tunnin kuluttua varjoaineen laitosta.

Tutkimushuoneessa sinut asetellaan kylkiasentoon.

Pistoalue pestään ja puudutetaan.

Röntgenlääkäri ruiskuttaa jodipitoista varjoainetta selkäydinkanavaan.

Tämän jälkeen selkärangastasi saatetaan ottaa eri asennoissa tavallisia röntgenkuvia.

Joudut makaamaan vuoteessa vuodeosastolla pää hieman kohotettuna TT-tutkimukseen asti.

Tutkimuksen aikana sinun tulee maata liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta.

Röntgenhoitajalla on sinuun puhe-, kuulo- ja näköyhteys.

Tutkimuksen jälkeen

Lannepiston jälkeen on oltava vuodelevossa 2 tuntia.

Tämän jälkeen voitiasi seurataan 2–4 tuntia.

Jos päänsärkyä tai muita oireita ei ilmene, voit lähteä TT-kuvauksen jälkeen kotiin.

Jos päänsärkyä tai muita oireita ilmenee, sinun tulee pysytellä vuoteessa ja joudut jäämään vuodeosastolle.

Jos oireita ilmenee kotiin päästyäsi, ota yhteyttä osastolle.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet saat radiologilta ja osaston lääkäriltä.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lisätietoa

Lue lisää internetistä: www.terveyskyla.fi/tutkimukseen >> Kuvantamistutkimuksia >>
[Tietokonetomografia- eli TT-tutkimus](#)

