

Ultraljudsledd provtagning av bukområdet

Du har fått en remiss till ingreppet.

Åtgärden tar vanligen 30–45 minuter.

En patient som behöver en brådskanie undersökning kan tas in före dig.

Efter åtgärden får du vila på avdelningen eller polikliniken på sjukhuset.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före åtgärden

- Ta läkemedlen som läkaren ordinerat enligt anvisning.
- Ät inte 3 timmar innan åtgärden.

Om du har blodförtunnande medicinering, ger din behandlande läkare

- anvisningar om hur du ska ta läkemedlen och
- en remiss till laboratorieundersökning.

Under åtgärden

Under åtgärden ska du klä av dig så att det undersökta området är bart och du får ligga på undersökningsbritten.

Röntgenläkaren lägger gel på området som ska undersökas och för ultraljudsgivaren på huden.

Röntgenläkaren bedövar stickstället och tar därefter ett prov med en nål.

Provet som har tagits skickas till laboratoriet för undersökning.

Efter åtgärden

- Efter åtgärden förs du till avdelningen eller polikliniken på sjukhuset där du ska vila i sängen. Läkaren på avdelningen eller polikliniken ger anvisningar om den fortsatta vården.
- Om provet tas från njuren kan urinen vara ljusröd under några dagar.
- Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig. Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till åtgärden.

Annat att beakta

- Inga separata avgifter tillkommer för åtgärden.
- Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kan du debiteras en straffavgift.

Mer information

Läs mer på internet: www.terveyskyla.fi/sv/undersokningshuset >> Om diagnostiska undersökningar >> [Ultraljudsundersökning](#)

Titta på video på YouTube: www.youtube.com >> [Tutkimukset minuutissa: Ultraääni \(rev2024\) - YouTube](#)