

Arteriovenöösien malformaation (AVM) embolisaatio

Olet saanut lähetteen valtimo-laskimoepämuodostuman tukkimishoitoon eli embolisaatioon.

Toimenpide kestää noin 1–4 tuntia.

Ennen toimenpidettä

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen toimenpidettä.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään toimenpidettä edeltävänä yönä kello 24 alkaen.
- Käy suihkussa toimenpidepäivän aamuna.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.
Jos sinulla on verenohennuslääkitys tai insuliinihoitoinen diabetes, hoitava yksikkö antaa sinulle lääkityksestä erillisen ohjeen.

Toimenpiteen aikana

Tulet aamulla joko osastolle tai röntgenin valvontaan tutkimusta varten.

Vaihdat sairaalan vaatteet ja tarvittaessa saat esilääkkeen.

Toimenpiteen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä.

Sinulle kerrotaan toimenpiteen etenemisestä.

Toimenpide tehdään yleensä nivustaipen valtimon kautta. Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri, josta ruiskutetaan varjoainetta ja hoitavaa lääkeainetta.

Toimenpiteen jälkeen

Kun toimenpide on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä. Tarvittaessa pistokohtaa tuetaan painopussilla.

Seuraavaksi sinut siirretään osastolle tai angion valvontaan.

Toimenpiteen jälkeen tulee olla 2–6 tuntia vuoteessa. Vuodelevon jälkeen on hyvä lepäillä seuraavaan aamuun, wc:ssä voi käydä. Toimenpiteen jälkeen saat syödä ja juoda vointisi mukaan normaalisti.

Ponnistelua on syytä välttää neljän päivän ajan.

Saunomista ja kylpemistä tulee välttää viikon ajan, suihkussa voi käydä toimenpiteen jälkeisenä päivänä.

Jälkihoidosta saat ohjeet röntgenosastolta.

Jos tulet toimenpiteeseen vuodeosastolta, pääset yleensä kotiin toimenpidettä seuraavana päivänä.

Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.