

Behandling av diarré

Diarré som förekommer under cancerbehandlingar ska behandlas så snabbt och effektivt som möjligt, eftersom den kan vara allvarlig om den inte behandlas. Lindrigt lös mage eller ibland förekommande diarré kan följas och behandlas hemma.

- Det är viktigt att dricka rikligt när man har diarré
- Det lönar sig att undvika mjölkprodukter som innehåller laktos under diarré.
- Genast efter den första diarréavföringen ska loperamidbehandling inledas (handelsnamn t.ex. Imodium®, Imocur®, Lopex®, Lopacut®). Ta genast två kapslar och därefter en kapsel efter varje diarréavföring.
- Du får ta högst åtta kapslar av läkemedlet per dygn, men inte i förebyggande syfte.
- **Om diarrén inte lindras** inom två dygn trots användning av medicineringen mot diarré enligt anvisningarna eller om du har en kraftig vattnig diarré eller feber, ska du **uppsöka akutmottagningen**
- Om du har en **kapecitabin- eller Teysuno®-medicinering** (en cytostatika i tablettform som tas hemma) ska du göra ett uppehåll i medicineringen om diarrégångerna än fler än fyra per dygn. Om du måste göra ett uppehåll med cancerläkemedlet ska du kontakta den behandlande enheten under tjänstetid.
- **Om du får immunologisk läkemedelsbehandling** och har diarré ska du kontakta den behandlande enheten under tjänstetid.