

Behandling av förkalkning i en axelsena vid Lojo sjukhus röntgen

Vid ingreppet avlägsnas förkalkning av rotatorkuffsenan i axeln med nål.

Kom till röntgen **30 minuter innan** den tid som meddelats till dig. Du får då värkmedicin.

Reservera 2 timmar för besöket. Åtgärden tar ungefär 30 minuter.

En patient som behöver en brådskanie undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen.

Före åtgärden

Du behöver inte förbereda dig för åtgärden.

Under åtgärden

Under åtgärden sitter eller ligger du.

En röntgenläkare letar efter kalken med ultraljud. En läkare bedövar området och spräcker kalken med en nål. Kalken sugas bort med en nål och en spruta.

Efter åtgärden sätts en mitella på armen.

Efter åtgärden följs ditt mående ännu ett tag vid röntgenenheten.

Efter åtgärden

- Belasta inte axeln. Utför inte för tungt arbete och utöva inte för tung motion.
- Låt inte axeln bli blöt på ett dygn.
- Håll armen i mitella i 4 dygn.

Axeln kan svälla eller bli sjuk. För detta kan du i förväg skaffa hem en ispåse eller kylgel.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.