

Behandling av förkalkning i en axelsena vid Pejas sjukhus röntgen

Vid ingreppet avlägsnas förkalkning av rotatorkuffsenan i axeln med nål.

Att observera när du kommer för åtgärden

Kom till röntgen **15 minuter innan den tid som meddelats till dig.**

Reservera 2 timmar för besöket. Åtgärden tar ungefär 30 minuter.

En patient som behöver en brådskanie undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen.

Under åtgärden

Under åtgärden sitter eller ligger du.

En röntgenläkare letar efter kalken med ultraljud. En läkare bedövar området och spräcker kalken med en nål. Kalken sugas bort med en nål och en spruta.

Efter åtgärden

- Använd inte axeln och den övre extremiteten under 3 dygn. Efter 3 dygn kan du röra den övre extremiteten på ett sådant sätt att det inte gör ont i axeln.
- Utför inte för tungt arbete och utöva inte för tung motion inom en vecka från ingreppet.
- Låt inte axeln bli blöt på ett dygn.

Axeln kan svälla eller bli sjuk. För detta kan du i förväg skaffa hem en ispåse eller kylgel.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.