

Borttagning av förändring i bröstkörtel på röntgenavdelning

Det har hittats en vävnadsförändring i ditt bröst som avlägsnas på röntgenavdelning. Åtgärden är ganska lik den provtagning som redan har gjorts åt dig.

Avlägsnandet av vävnaden är en mindre åtgärd än en sådan åtgärd som görs i en operationssal.

Vänligen kom till undersökningen **15 minuter före den bokade tiden**.

Reservera 2 timmar för besöket. Åtgärden tar cirka 1 timme.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före åtgärden

Kontakta den vårdande läkaren om du

- är allergisk mot bedövningsmedel,
- använder blodförtunnande läkemedel eller
- använder Omega 3-produkter.

När du kommer till åtgärden, ta med dig en BH eller topp som ger stöd för bröstet.

Under åtgärden

För åtgärden klär du av övre delen av kroppen. Stället för vävnadsförändringen säkerställs med en ultraljuds- eller mammografiapparat.

Röntgenläkaren bedövar bröstet och tar bort vävnadsförändringen.

Den borttagna vävnadsförändringen skickas för undersökning till laboratorium.

Efter åtgärden

- Håll såret torrt under ett dygn.
- Därefter kan du avlägsna sårförbanden och duscha.
- Använd BH eller topp som stöder bröstet under 2 dygn.
- Undvik fysisk ansträngning under 2 dygn.
- Bada inte bastu eller i badkar eller simma inte under en vecka efter åtgärden.

Du kan känna smärta i bröstet. Du kan ta paracetamol mot smärtan (till exempel Panadol® eller Paratabs®) eller ibuprofen (till exempel Burana® eller Ibumax®).

Använd inte acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin® eller Disperin®).

Provet från bröstet undersöks. Det tar cirka 1 vecka att färdigställa provet.

Svaren från undersökningen får du från den hälsovårdscentral, poliklinik eller avdelning som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för åtgärden.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.