

Botoxbehandling i röntgen före bråckoperation

Du har konstaterats ha bråck och har fått en tid för operation från den enhet som vårdar dig. Före operationen är det meningen att botulin, det vill säga Botox, ska injiceras i dina magmuskler.

Behandlingen som görs i röntgen är avsedd att tillfälligt försvaga de sneda magmuskulernas funktion under 2–4 veckor före operationen. Det här gör det enklare att utföra bråckoperationen.

Anmäl dig i röntgen 15 minuter före den tid för åtgärden som du har fått.

Reservera cirka 1 timme för åtgärden. Åtgärden varar vanligtvis 20 minuter. En patient som behöver en brådsakande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen.

Om du har blivit ombedd att ta ett blodprov, besök laboratoriet 2–7 dagar före åtgärden.

Före åtgärden

- Du behöver inte förbereda dig för åtgärden.

Under åtgärden

Under själva åtgärden ska du klä av dig på överkroppen. Under åtgärden ligger du på rygg eller lite på sidan på undersökningsbordet.

Röntgenläkaren använder en ultraljudsapparat för att hitta de sneda magmuskulerna, och injicerar med hjälp av en tunn nål Botox i muskelskiktet.

Totalt läggs 6 injektioner, 3 injektioner på såväl höger som vänster sida.

De små hål som uppstår av injektionen täcks med plåster.

Den förlamande inverkan som Botox har på musklerna uppstår gradvis och är som kraftigast vid den tidpunkt när din operation har planerats att äga rum.

Efter åtgärden

- Håll injektionsställen torra under ett dygn efter åtgärden.
Du ska till exempel inte duscha, bada eller simma.
- Ta bort plåstret efter ett dygn.
- Undvik fysisk ansträngning under 1 dygn. Gå till exempel inte på gym och bär inte tunga matkassar.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för åtgärden.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kan du debiteras en straffavgift.