

Kontrastundersökning av avföringsfunktionen vid Hyvinge sjukhus

Undersökningen utreder ändtarmens funktion och eventuell sänkning av bäckenbotten vid avföring. Under undersökningen tas röntgenbilder.

Undersökningen kallas också defekografi.

Kom 2 timmar före undersökningen för att dricka kontrastmedel.

Reservera cirka 3 timmar för besöket. Undersökningen tar cirka 30 minuter.
En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före undersökningen

- Om du är gravid eller misstänker att du är gravid ska du meddela det så fort som möjligt till läkaren som skickade dig till undersökningen.
- Köp på apoteket en Toilax-kombinationsförpackning. Förpackningen innehåller 4 tabletter för oral användning och 1 lavemang.

Dagen före undersökningen

- Ät och drick som vanligt.
- Ta läkemedel som vanligt.
- Ta på morgonen 2 Toilax tabletter med kallt vatten eller saft.
- Ta på kvällen 2 Toilax tabletter med kallt vatten eller saft.

Samma dag som undersökningen

- Lagg lavemanget hemma 3–4 timmar innan undersökningen. Följ instruktionerna på förpackningen.
- Lavemanget tömmer ändtarmen före undersökningen.
- Ät eller drick inget de 4 sista timmarna innan undersökningen.
- Ta läkemedel som vanligt.

Under undersökningen

På röntgenenheten får du kontrastmedel att dricka 2 timmar före undersökningen. Kontrastmedlet du dricker orsakar att ändan av tunntarmen syns på röntgenbilderna.

Om du är kvinna, besök kvinnokliniken 2 timmar innan undersökningen. Där kommer du att få en tampong fuktad med jodkontrastmedel. Tampongen används för att observera hur vaginan rör sig vid avföring och tas bort efter undersökningen.

Efter att du druckit kontrastmedlet, kan du avlägsna dig från röntgenenheten. Du måste ändå återvända på avtalad tid.

I själva undersökningen injicerar man kontrastmedel via ändtarmsöppningen till ändtarmen. Då ligger du på sidan på undersökningsbordet.

När kontrastmedlet har injicerats tar röntgenläkaren röntgenbilder. Bilderna tas när du sitter på ett kärl. Bilderna tas i sittande ställning, när du krystar och när du bajsar.

Efter undersökningen

- Kontrastmedlet som sätts i ändarmen kan färga avföringen vit.
- Drink mer än vanligt. Då avlägsnar sig kontrastämnet bättre från tarmen.

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Ta med dig tidigare röntgenbilder (CD-skiva) av området som ska undersökas om du har fått dem.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.