

Lapsen ulostustapahtuman varjoainetutkimus Uudessa lastensairaalassa

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen toimintaa. Tutkimuksessa kuvataan lantion aluetta röntgenlaitteella.

Tutkimuksesta käytetään myös nimitystä defekografia.

Tulkaa röntgeniin **2 tuntia ennen tutkimusaikaa**. 2 tuntia ennen tutkimusta lapsi juo varjoainetta. Juotu varjoaine auttaa ohutsuolen loppuosan näkymistä kuvissa.

Kun lapsi on juonut varjoaineen, voitte poistua röntgenistä. Teille kerrotaan röntgenistä, milloin teidän on tultava takaisin.

Varatkaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 3 tuntia. Varsinainen kuvaus kestää 20–40 minuuttia.

Lapsi, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta voi päästä tutkimukseen ennen lastasi.

Saapumisohjeessa on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta

Teidän ei tarvitse valmistautua tutkimukseen.

Tutkimuksen aikana

Itse tutkimuksessa lapselle laitetaan varjoainetta peräaukon kautta peräsuoleen. Sen aikaa lapsi makaa tutkimuspöydällä kyljellään.

Kun varjoaine on laitettu, röntgenlääkäri ottaa röntgenkuvia. Kuvat otetaan, kun lapsi istuu pöntöllä, joka on kuvauslaitteen edessä.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa lastasi.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta lapsi lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Ota mukaasi lapsen Kela-kortti tai henkilötodistus.

Yksi aikuinen voi olla lapsen mukana tutkimuksessa.

Raskaana oleva tai raskautta epäilevä ei saa olla kuvaushuoneessa

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos ette pääse tulemaan.