

Poliklinisk kontrastundersökning av ärtarna

Du har fått en remiss för en poliklinisk angiografiundersökning. Med angiografi avses en kontrastundersökning av blodkärlen.

Undersökningen kallas också poliklinisk angiografi.

Undersökningen tar i regel 1–3 timmar och eftervården ytterligare 2–6 timmar.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före undersökningen

Om du är överkänslig för bedövningsmedel eller jodhaltigt kontrastmedel eller om du är/misstänker att du är gravid, ska du informera den remitterande läkaren eller röntgenskötaren om detta före undersökningen.

- Ät, drick och rök inte under minst 4 timmar före undersökningen.
- Ta en dusch på morgonen samma dag som undersökningen ska genomföras.
- Ta de läkemedel som läkare ordinerat som vanligt.
- Om du använder blodförtunnande läkemedel eller har insulinberoende diabetes, ger den vårdande enheten separata anvisningar om medicineringen.
- Observera att du inte får köra bil efter undersökningen den dagen.
- Ta med dig mellanmål.
- Avtala om att din följeslagare hämtar dig från sjukhuset efter undersökningen och se till att du har sällskap hemma ända till morgonen efter undersökningen.
- Observera att du inte får köra bil efter undersökningen den dagen.
- Ibland kräver behandlingen att man stannar kvar på sjukhuset; var beredd på detta.

Under undersökningen

Före undersökningen klär du dig i sjukhusets kläder och vid behov får du premedicinering. En kanyl förs in i handvenen.

Medan undersökningen pågår ligger du på rygg på undersökningsbordet. Du får information om hur undersökningen framskrider.

Undersökningen genomförs i allmänhet via ljumskvenen i lokalbedövning. En tunn avbildningskateter förs in i blodådern, kontrast-medel sprutas in och röntgenbilder tas. Kontrastmedlet kan skapa värmekänsla.

Undersökningen omfattar eventuellt en behandlingsåtgärd, till exempel ballongdilatation eller insättning av en stent.

Efter undersökningen

När undersökningen är klar sluts hålet i blodådern. Vid behov stöds punktionsstället med en tyngdpåse.

Efter undersökningen ska man ligga till sängs i 2–6 timmar.

Efter säng-vilan är det bra att ytterligare vila till följande morgon. Man kan gå på toaletten.

Det är skäl att undvika ansträngningar i fyra dagar. Bastu och bad bör undvikas i en vecka, men man kan ta en dusch dagen efter undersökningen.

Röntgenavdelningen ger nog-grannare anvisningar om eftervården.

Efter undersökningen får du äta och dricka som normalt om du mår bra.

Om behandlingen kräver att du stannar kvar på sjukhuset, ordnas en plats för den fort-satta vården på sjukhusets bäddavdelning fram till kvällen på undersökningsdagen eller vid behov för en längre tid.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.