

Eritetahradesinfektio

Eritteet kuten veri, virtsa, maha-suolikanava-, haava- ja trakeaeritteet sisältävät usein paljon mikrobeja. Lattia-, kaluste- ja kosketuspinnolla eritetahrat toimivat mikrobien kasvualustana ja aiheuttavat sairaalassa infektioriskin. Henkilökunnan tulee poistaa eritetahra ja desinfioida kontaminoitunut alue heti sen havaittuaan. Eritetahrojen poistoon tarvittavat välineet sijoitetaan osastolla yhteisesti sovittuihin paikkoihin.

Eritetahradesinfektioaineet:

Oxivir Sporicide Spray (vetyperoksidi) 6 % valmis käyttöliuos, tehoaa norovirukseen, Cl. difficile -bakteerin itiöihin

Oxivir Plus Spray (vetyperoksidi) 3,5 % käyttöliuos tehoaa norovirukseen ja laitoshuollon valmistaman **15 %** käyttölaimennosliuos tehoaa Cl difficile -bakteerien itiöihin

Klorilli (klooriyhdiste, kloramin-T) 1 000 ppm käyttöliuos tehoaa Cl. difficile- bakteerin itiöihin

Käyttölaimennosliuos valmistetaan osastolla tarkoitusta varten nimikoituun annostelupulloon. Laimennos tehdään pakkauksen ohjeen mukaisesti. **Liuoksen viimeinen käyttöpäivä merkitään käyttölaimennosliuospulloon. Jos käytetään valmista käyttöliuosta (spray), kts. käyttöpäivämerkintä pullosta.** Noudata lisäksi valmistajan puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Tutustu myös Pintadesinfektioaineet ohjeeseen.

Välineet

- kertakäyttöisiä suojakäsineitä
- käsidesinfektioaine
- imeviä kertakäyttöpyyhkeitä
- eritetahradesinfektioaine
- roskapussi

Toteutus – Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio

- Desinfioi kädet.
- Pue kertakäyttöiset suojakäsineet.
- Imeytä erite kertakäyttöpyyhkeeseen käyttäen yhtä kättä ja laita likainen pyyhe roskeen.
- Lisää eritealueen päälle eritetahradesinfektioainetta pitäen desinfektioainetta puhtaassa kädessä.
- Pyyhi pinta puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä ja laita kertakäyttöpyyhe roskeen.
- Riisu suojakäsineet roskapussiin.
- Pese ja desinfioi kädet.
- Vaikutusaika on pinnan pyyhintään ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita.
- Huolehdi, että erite ja poistamisessa käytettävät välineet eivät levitä mikrobeja edelleen.

Laajalla alueella olevat eritteet poistetaan ensin teräväkuivaimella ja pinta pyyhitään desinfektioaineeseen kostutetuilla kertakäyttöisillä siivouspyyhkeillä.

Muutoshistoria

10.11.2020	Ohje julkaistu
15.6.2021	Korvaa 10.11.2020 version
9.6.2025	Korvaa aiemman ohjeen 22.6.2021 version