

Peräsuolen magneettikuvaus

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen rakennetta ja mahdollisia muutoksia.

Magneettikuvauksella saadaan tarkkoja kuvia ilman säteilyä.

Kuvaus tehdään laitteella, joka on kuin molemmista päistä auki oleva tunneli.

Tutustu magneettitutkimuksen esitietolomakkeeseen etukäteen.

Ota täytetty esitietolomake mukaasi.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3 tuntia.

Tutkimus kestää yleensä 30–60 minuuttia.

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Jos sinulla on ahtaanpaikankammo kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Sinulla on mahdollisuus saada rauhoittavaa lääkettä ennen tutkimusta.

Jos otat rauhoittavan lääkkeen, et voi ajaa autolla.

Voit ottaa mukaan tukihenkilön.

Hän voi olla kuvauksen aikana kuvaushuoneessa, jos hänellä ei ole siihen esteitä.

Katso magneettitutkimuksen esitietolomake.

Jos sinulla on lonkassa keinonivel eli lonkkaproteesi, soita siihen yksikköön, johon sinulle on varattu kuvausaika.

Lonkan keinonivel voi vaikuttaa siihen, millä laitteella sinut kuvataan. Yhteystiedot ovat saapumisohjeessa.

Ennen tutkimusta

Suoliston tyhjentämistä varten osta apteekista Toilax- yhdistelmäpakkaus, jossa on 4 tablettia ja peräruiske. Saat ne ilman reseptiä.

On tärkeää, että tyhjennät peräsuolen ohjeen mukaan.

Peräsuolta ei tyhjennetä, jos sinulla on pysyvä avanne.

Tutkimusta edeltävänä päivänä:

- Syö ja juo normaalisti
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.
- Ota aamulla 2 Toilax-tablettia.
- Ota illalla 2 Toilax-tablettia.

Älä ota Toilax-tabletteja, jos sinulla on pysyvä avanne.

Tutkimuspäivänä:

- Laita kotona 3–4 tuntia ennen tutkimusta peräruiske.
Ohje on pakkauksessa.
Peräruiske tyhjentää peräsuolen.

Peräsuolta ei tyhjennetä, jos sinulla on pysyvä avanne.

- Älä syö mitään 4 tuntiin ennen tutkimusta.
- Voit juoda vettä
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti.
- Ota korut pois ja jätä ne kotiin.
- **Jos sinulla on lääkelaastari**, ajoita sen vaihto tutkimuspäivään.
Ota vanha laastari pois tutkimuksen ajaksi.
Laita uusi lääkelaastari tutkimuksen jälkeen.
- **Jos sinulla on kudosnesteiden sokeria mittaava sensori**, se on otettava pois ennen kuvausta.
Ota uusi sensori mukaan.

Tutkimuksen aikana

Ennen tutkimuksen aloittamista sinun on käytävä wc:ssä.

Ennen kuvausta vaihdat sairaalan vaatteet.

Röntgenhoitaja auttaa sinut mukavaan makuuasentoon.

Et saa liikkua, jotta kuvaus onnistuu.

Saat korville korvatulpat ja kuulosuojaimet, koska kuvauslaite pitää kovaa ääntä.

Voit kuunnella radiota, jos haluat.

Röntgenhoitaja on tutkimuksen ajan viereisessä huoneessa.

Hän näkee ja kuulee sinut tutkimuksen aikana.

Käsivarren laskimoon laitetaan kanyyli.
Saat sen kautta lääkettä, joka rentouttaa suolistoa.
Näin saadaan paremmat kuvat.

Röntgenlääkäri päättää, tarvitseeko sinulle antaa magneettitehosteainetta verisuoneen.
Tehosteaine auttaa siinä, että kudokset erottuvat kuvissa.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lisätietoa

Lue lisää internetistä www.tutkimukseen.fi >> Eri tutkimuksia >> Magneettitutkimus

Katso video www.youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: [Magneettikuvaus](#). Tekstitys: suomi, ruotsi, englanti

