

Elinsiirtopotilaan rokotekaavio ennen elinsiirtoa SU

Ennen elinsiirtoa **rokotesuoja tulisi selvittää alla olevassa taulukossa olevien rokotteiden osalta yhdessä ammattilaisen kanssa**. Rokotteet suositellaan otettavan ennen elinsiirtoa ja rokotekohtaisesti myös elinsiirron jälkeen. Lisätietoja suositeltavien rokotteiden osalta kotikunnan terveydenhuollossa hyödynnettäväksi löytyy HUS:in nettisivulta: hus.fi → Ammattilaiselle → Ammattilaisten palvelut ja ohjeet → Elinsiirto ja elinluovutus → Elinsiirtopotilaiden rokotussuositus

Jos on raxittu kohta "Selvitettävä", **tulisi potilaan itse selvittää, onko hän saanut rokotteen ja milloin** esimerkiksi kysymällä rokotetietoja omalta terveysasemalta tai omaiselta. Jos potilas on saanut kyseisen rokotteen tai sairastanut taudin, hän raxittaa "Rokote kunnossa/sairastettu" ruudun, kirjaa päivämäärän ja yliviivaa "Selvitettävä" ruudun. Jos selviää, että potilas ei ole saanut rokotetta (eikä sairastanut), hän merkkää "Ei saatua rokotetta" ja yliviivaa "Selvitettävä" ruudun.

Sitten kun kaikkien rokotteiden rokotesuojan voimassaolo **on selvitetty, tulisi rokotteet hankkia niiden osalta, jossa on ruksi kohdassa "Rokotetta ei ole saatu"**. Lääkäri määrää tarvittavat reseptit ja itse kustannettavat rokotteet potilaan tulee itse hankkia apteekista. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet potilas saa ilmaiseksi omalta terveysasemalta. Rokotteiden pistoa varten potilas varaa ajan esim. omalta terveysasemalta tai työterveydestä.

Taulukon sarakkeiden selitykset:

Rokote kunnossa/sairastettu = rokotesuoja on voimassa, ei vaadi toimenpiteitä
Rokotetta ei ole saatu = tiedetään, että rokotesuoja ei ole voimassa ja tulee hankkia
Selvitettävä = ei ole varmuutta rokotesuojasta, tulee selvittää
Ei tarvetta = ei vaadita rokotesuojaa

Rokote	Rokote kunnossa/sairastettu	Rokotetta ei ole saatu	Selvitettävä	Ei tarvetta
Pneumokokki PCV20 (Apexxnar®, Prevenar 20®)	☐	☐	☐	☐
Meningokokki ACW135Y (Menveo®, Nimenrix®)	☐	☐	☐	☐
Meningokokki B (Bexero®, Trumemba®)	☐	☐	☐	☐
Haemophilus influenzae-B (HIB) (ACT-HIB®, Hiberix®)	☐	☐	☐	☐
Kurkkumätä-jäykkäkouristus (dT) (Ditebooster®) tai Kurkkumätä- jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokote (dtap) (Triaxis®, Boostrix®, Ditekibooster®)	☐	☐	☐	☐
Influenssa (Vaxigriptide®)	☐	☐	☐	☐
Hepatiitti A ja B (Twinrix®)	☐	☐	☐	☐
Hepatiitti A (Havrix®)	☐	☐	☐	☐
Hepatiitti B (Engerix-b®, HBVAXPRO®)	☐	☐	☐	☐
Vesirokko (Varilrix®)	☐	☐	☐	☐
Ihmisen papilloomavirus, HPV (Gardasil®)	☐	☐	☐	☐
Tuhkarokko- sikotauti- ja vihurirokkorokote (Priorix®, M-M-RVAXPRO®)	☐	☐	☐	☐
COVID-19 rokotteiden suhteen noudatetaan THL:n ajankohtaisia riskiryhmien suosituksia	☐	☐	☐	☐