

## Kryobehandling av mjölkkörtel vid Kvinnoklinikens röntgen

Du har konstaterats ha en tumör och din behandlande läkare har begärt frysbehandling (kryobehandling) på röntgen. Behandlingen genomförs av röntgenläkaren under lokalbedövning med hjälp av en nål.

Behandlingen kallas även för kryoablation.

Reservera 2 timmar för besöket. Behandlingen tar vanligen 40 minuter.

När du kommer till behandlingen, klä hemma på dig en BH eller en spänd topp eller ta dem med dig.

Observera att du inte kan ägna dig åt tung motion på två dagar efter behandlingen.

### Före behandlingen

- Ät och drick som vanligt.
- Ta läkemedlen som läkaren ordinerat på normalt sätt.
- Om du har medicinering som påverkar blodets koagulering, kommer din behandlande läkare att ge anvisningar om hur du ska ta läkemedlen.

### Under behandlingen

Under behandlingen ligger du endera på rygg eller på sidan på undersökningsbordet.

Röntgenläkaren lokaliserar rätt plats med hjälp av en ultraljudsapparat. Därefter bedövar hen området där behandlingen ska utföras med en nål.

Röntgenläkaren placerar en behandlingsnål i tumören. Nålen i tumören kyls ner två gånger. Efter behandlingen tas nålen bort.

Ett litet sår blir kvar på huden efter nålen och det täcks med sårtejp på röntgenenheten. Dessutom placeras ett sårförband över behandlingsområdet för att skydda huden.

## Efter behandlingen

- Det är vanligt med smärtor i det behandlade området och att det är svullet under 2–7 dagar.
- Du kan ta paracetamol mot smärtan (till exempel Panadol® eller Paratabs®) eller ibuprofen (till exempel Burana® eller Ibumax®). **Använd inte** acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin® eller Disperin®).
- Under 7 dagar ska du inte bada bastu, simma eller bada i badkar.
- En knöl, som minskar i storlek inom 6 månader, blir kvar i bröstet.

## För mera information

Om du behöver mer information om frysbehandlingen, ring din behandlande enhet, det vill säga den enhet som gav dig tiden till röntgen.