

Laskimomalformaation skleroterapia

Olet saanut lähetteen laskimoepämuodostuman skleroterapiaan.

Toimenpiteen kesto on yleensä 0,5–1 tuntia ja jälkihoito 0,5–2 tuntia.

Ennen toimenpidettä

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen toimenpidettä.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 4 tuntia ennen toimenpidettä.
- Käy suihkussa toimenpidepäivän aamuna.
- Ota tukisukka/tukihaha mukaan.

Varaudu siihen, ettet voi mahdollisen lääkityksen vuoksi ajaa autolla toimenpiteen jälkeen 6 tuntiin.

Toimenpiteen aikana

Ennen toimenpidettä vaihdat sairaalan vaatteet.
Käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Aluksi katsotaan ultraäänellä hoidettavaa kohdetta ja päätetään hoitoasento.
Sinulle kerrotaan toimenpiteen etenemisestä.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa.

Verisuoneen laitetaan ohut neula, josta ruiskutetaan varjoainetta ja hoitavaa lääkeainetta.

Toimenpiteeseen voi liittyä kipua, johon saat kipulääkettä.

Toimenpiteen jälkeen

Kun toimenpide on valmis, menet lepäämään röntgenosaston valvontaan.

Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen.

Jälkihoidosta saat tarkemmat ohjeet röntgenosastolta.

Toimenpiteen jälkeen saat syödä ja juoda vointisi mukaan normaalisti.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.